




Envase hermético.
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.
Maximum Vigor and Germination.



Marco de siembra
DISTANCIA
a= 120 cm
b= 70 cm
PROFUNDIDAD:
de 3 a 4 cm



Marco de plantación
a= 120 cm
b= 70 cm

CALABACIN VIRGINIA. Variedad temprana de mata compacta. Frutos medio largos de piel blanca y carne fina. **Siembra.** En hoyos al marco de 120 cm x 70 cm situando 6/7 semillas/hoyo preparado con arena y humus. Enterrar la semilla 5/6 cm. **Terreno.** Suelo franco y con temperatura mínima de 12-14 °C. **Aclareo.** A las 4 hojas dejando 3 plantas/hoyo. **Abonado.** De equilibrio 1-2-2.

SUMMER SQUASH - VIRGINIA. Early variety with compact shrub. Medium long fruit with white skin and smooth flesh. **Sow** 6-7 seeds per hill at a depth of 5-6 cm in 120 cm rows with 70 cm between plants in the same row after preparing soil with sand and humus. **Soil** loamy with minimum temperature of 12-14°C. **Thin** plants to 3 per hill after appearance of fourth leaf. **Fertilize** with a 1-2-2 mixture.



COURGETTE VIRGINIA 3. Variété précoce à la végétation compacte. Fruits semi-longs, à peau blanche et chair fine. **Semer** de mars à mai, en poquets, à raison de 6 à 7 graines, à intervalles de 120 x 70 cm. La culture s'effectuera sur un sol argilo-sablonneux avec un mélange de terre végétale et à une température du sol avoisinant les 12° à 14°. **Eclaircir** lorsque la plante a 4 à 5 feuilles, en laissant 3 plantes par poquet.

ZUCCHINO VIRGINIA 3. Varietà precoce a vegetazione compatta. Frutti semi-lunghi chiari ed a polpa fine. Seminare a buche alla distanza di 120 cm x 70 cm mettendo 6/7 semi per buca preparata con sabbia ed humus. **Terreno.** Sabbioso-argilloso e con temperatura minima di 12-14 °C. **Diradamento.** Alla 4 foglia lasciando 3 piante a buca. **Concimazione.** Di equilibrio 1-2-2.

ABOBORA VIRGINIA. Variedade temporã de vegetação compacta. Fruto meio comprido de casca branca e polpa fina. **Sementeira.** Em covachos à distância de 120 cm x 70 cm, colocando 6-7 sementes por covacho preparado com areia e humus. Enterrar a semente 5-6 cms. **Terreno.** Solo franco, com temperatura mínima de 12-14 °C. **Desbaste.** Às 4 folhas deixando 3 plantas por covacho. **Fertilização.** Respeitar o equilíbrio 1-2-2.

KDAOKYBAKI VIRGINIA
Παλαιά πρώτη συμπηγούς φυλλώματος. Καρποί μακρόστενοι λευκού χρώματος. Σπάρει σε σειρές ανά 70 εκ. και σε απόσταση 120 εκ. μεταξύ των σπόρων τοποθετώντας 6/7 σπόρους σε κάθε τρύπα και σε βάθος 5/6 εκ. Έδαφος: ελάχιστη θερμοκρασία 12-14 °C. Λίπασμα: σε αναλογία 1-2-2.

كوسا طويلة خضراء . نوع قوي ومكثف ثماره طويلة لونها اخضرمنقط بلون اخضر داكن ولحمه تقطف عند وصول طول الثبته الى ٢٠ سم الزرع: على بعد ٧٠ - ١٢٠ سم بثرية درجة حرارتها لا تقل عن ١٢ درجة مئوية بوضع ٥ - ٦ حبات في حفرة مع تراب وديال . التفريق: تفرق عند ظهور ٤ وريقات متفرع ٣ نباتات في حفرة واحدة. التسميد: بنسبة ١ - ٢ - ٢.



● Siembra - Semis
Sowing time

--- Crecimiento hasta trasplante
Growth until transplantation

✕ Transplante - Repiquage
Transplantation

— Crecimiento hasta maduración
Growth until Ripening

■ Recolección - Récolte
Harvesting

□ Conservación
Storage

⌒ Protección con túnel de plástico
Plastic tunnel protection

Normas y reglas CEE - Categoría Standard
CEE rules and standards
SEMILLAS FITO, S.A. Barcelona (España)



Lot	Date dernière analyse	Controlée jusqu'en	Contenu
Lote	Fecha último análisis	Control hasta	Contenido

THIRAM-A
408950-02

11-07 2012

5

GRS NETO