


SEMILLAS

FITO

Envase hermético.
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.
Maximum Vigour and Germination.



Marco de siembra
DISTANCIA
a= 100 cm
b= 100 cm
PROFUNDIDAD:
de 2 a 3 cm



Marco de plantación
a= 100 cm
b= 100 cm

■ **PEPINILLO SMR-58.** Planta que da frutos de tamaño reducido, cosechándose inmediatamente después de la floración. Adecuado para conservar en salmuera. Siembra. A golpes al marco de 100 x 100 cm introduciendo 6/8 semillas/hoyo. Aclareo. Cuando las plantas tienen 10 cm dejando 2 o 3 plantas por golpe.

■ **PICKLING CUCUMBER - SMR-58.** Yields small sized fruit when harvested immediately after flowering. Good for pickling. Sow in groups spaced 100 x 100 cm apart, 6 to 8 seeds per hole. Thin when plants reach 10 cm, leaving 2 or 3 plants per group.

■ **CORNICHON SMR-58.** Fruit de taille moyenne. Se récolte immédiatement après la floraison. Bon pour la conserve. Semer en mars/avril, en poquets, à raison de 6 à 8 graines, à intervalles de 100 x 100 cm. Eclaircir en respectant ces distances, en laissant 2 à 3 plantes par poquet.


■ **CETRIOLINO SMR-58.** Frutti di taglia media, da raccogliere immediatamente dopo la fioritura. Adatti da conservare in salamoia. Semina. In buca alla distanza di 100 x 100 cm. utilizzando 6/8 semi per buca. Diradamento. Quando le piante sono alte 10 cm. lasciando 2 o 3 piante per buca.

■ **PEPINO CORNICHON SMR-58.** Planta com frutos de tamanho reduzido, colhendo-se imediatamente após a floração. Adequado para conservar em salmoura. Sementeira. A golpe, distanciada de 100 cm x 100 cm, colocando 6-8 sementes por golpe. Desbaste. Quando as plantas tiverem 10 cm, deixando 2 ou 3 por golpe.


■ **ΑΙΤΟΥΡΑΚΙ SMR - 58**
Φυτό που παράγει καρπούς μικρού μεγέθους, των οποίων η συγκομιδή γίνεται αμέσως μετά από την άνθιση. Κατάλληλο για τουρίσι. Σπορά: με το χέρι σε σειρές ανά 100 εκ. και σε απόσταση μεταξύ των σπόρων 100 εκ. τοποθετώντας 6/8 σπόρους σε κάθε τρύπα.

■ خيار صغير س م و ه ا ر ٥٨ تعطي ثماراً حجمها صغير تؤخذ مباشرة بعد التزهير صالحة للمخلات لوزج: مجموعات على بعد ١٠٠ × ١٠٠ سم. بوضع ٨-٦ بذور بكل حفرة التفريق: عندما تصل إلى ١٠ سم. بوضع ٢-٦ نباتات بكل حفرة.

CLIMA MEDITERRANEO



CLIMA CONTINENTAL



● Siembra - Semis
Sowing time

--- Crecimiento hasta trasplante
Growth until transplantation

× Transplante - Rapiquage
Transplantation

— Crecimiento hasta maduración
Growth until Ripening

■ Recolección - Récolte
Harvesting

□ Conservación
Storage

mm Protección con túnel de plástico
Plastic tunnel protection

Normas y reglas CEE - Categoría Standard
CEE rules and standards

SEMILLAS FITO, S.A. Barcelona (España)

Lot Date dernière Controlée Contenu

analyse jusqu'en

Lote Fecha último Control Contenido

análisis hasta



10 GRS NETO