



Envase hermético.
Máximo Vigor y Germinación.

Hermetic packing.
Maximum Vigour and Germination.



Distancia	Profundidad
a	0 2 4 6 8
b	10



Marco de siembra

DISTANCIA

a= 40 cm

b= 20 cm

PROFUNDIDAD:

de 0,5 a 1 cm

Marco de plantación

a= 40 cm

b= 10 cm

■ **PUERRO MONSTRUOSO DE PLATA.** De fuste largo, medianamente grueso, casi todo él blanco, de sabor dulce y resistente a bajas temperaturas. **Siembra.** En líneas equidistantes 40 cm enterrando la semilla 1/2 cm. **Aclarado.** Escalonado, dejando finalmente una planta cada 10 cm. **Abonado.** De equilibrio nutricional 2-2-1. **Recolección.** Previo aportamiento 15/20 días antes de la cosecha para obtener tallos blancos.

■ **LEEK - MONSTRUOSO DE PLATA.** Long, medium thick, pure white shaft. Sweet flavor, resistant to cold weather. **Sow** at a depth of 0.5 cm in 40 cm rows. **Thin** as plants develop to final spacing of 10 cm within the same row. **Fertilize** with a 2-2-1 mixture. **Harvest** mound earth around stems 15 to 20 days prior to harvest to whiten stems.

■ **POIREAU MONSTREUX ARGENT.** Fût long moyennement long et pratiquement tout blanc. D'un goût très doux et résistant aux basses températures. **Se-smer** de mars à mai en lignes espacées de 40 x 10 cm. Butez 15 à 20 jours avant la récolte, pour obtenir un blanchiment du fût.



■ **PORRO MOSTRUOSO ARGENTATO.** Pianta di fusto lungo, medianamente grosso, quasi completamente bianco di sapore dolce e resistente alle basse temperature. **Se-mina.** In file equidistanti 40 cm. interrando il seme a 1/2 cm. **Diradamento.** Scaglionato lasciando una pianta ogni 10 cm. **Concimazione.** Di equilibrio nutrizionale 2-2-1. **Raccolta.** Rincalzare le piante 15/20 giorni prima della raccolta per ottenere l'imbianchimento del fusto.

■ **ALHO FRANCÊS MONSTRUOSO DE PRATA.** De fuste comprido, medianamente grande, quase todo branco, de sabor doce e resistente a baixas temperaturas. **Se-manteira.** Em linhas equidistantes de 40 cm, enterrando a semente 1-2 cm. **Desbaste.** Escalonado, deixando finalmente 1 planta cada 10 cm. **Fertilização.** Equilíbrio nutricional 2-2-1.

■ ΠΑΡΑΣΟ ΜΟΝΣΤΡΟΥΟΣ ΟΦΑΙΔΗΣ

Κορμός μακρουλός, μέτρου πάχους, σχεδόν ολόκληρος λευκός, γλυκιάς γεύσης και ανθεκτικός στις χαμηλές θερμοκρασίες. Σπορά: σε σειρές ανά 40 εκ. και σε βάθος 1/2 εκ. Λίπασμα: σε αναλογία 2-2-1. Συγκομιδή: αφού σκεπαστούν με χώμα για 15/20 ημέρες, για την επίτευξη λευκών κορμών.

■ **Κράτος** كثيف من بلادنا. نوع عروق طولية متوسطة الحنف وتقريباً كلها أبضم طعمه حلو ويتحمل درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة: في انتقام متباعدة ٤٠ سم بعمر البذرة نصف سم. التغذية: بالتلحين وترك اختيارياً واحدة كل ١٠ سم. التسميد: نسبة التغذية ٢-٢-١-٢ الصصاد: يغطي بالتراب من ٥-٧-٩ يوماً قبل الحصاد للحصول على ثمار أبيض.



● Siembra - Semis
Sowing time

— Crecimiento hasta trasplante
Growth until transplantation

X Transplante - Repique
Transplantation

— Crecimiento hasta maduración
Growth until Ripening

█ Recolección - Récolte
Harvesting

□ Conservación
Storage

mmm Protección con túnel de plástico
Plastic tunnel protection

Normas y reglas CEE - Categoría Standard
CEE rules and standards
SEMILLAS FITÓ, S.A. Barcelona (España)



Lot	Date dernière analyse	Contrôle jusqu'en	Contenu
Lote	Fecha último análisis	Control hasta	Contenido

328132-01 01-08 2011



GRS NETO