

NOMBRE:	<i>SUPERIOR SEEDLESS</i>	
Origen:	California. Cruce de Cardinal x apirena (no la mencionan).	
Sinonímias:	Regular Superior Seedless, Sugra One , Sugraone, Superior .	
Fenología: Las fechas indicadas resultan de observaciones realizadas en campos de referencia, pudiendo variar según la zona de cultivo.	Estación:	Muy temprana.
	Fecha Brotación:	2 de marzo.
	Fecha Floración:	3 de mayo.
	Fecha Envero:	23 de junio.
	Fecha Maduración:	24 de julio.
	Fecha caída hoja:	10 de noviembre.
Racimo:	Medio a grande, cónico, a veces alado y semicompacto.	
Baya:	Color:	Verde claro, verde amarillento.
	Forma:	Ovoidal.
	Tamaño:	Medio a grande.
	Sabor:	Ligeramente aromático.
	Pulpa:	Crujiente.
	Piel:	Gruesa, consistente y algo pruinosa.
	Semillas:	Apirena (sin semillas).
Fertilidad:	Baja.	
Producción:	Media.	
Vigor:	Muy alto.	
Conducción:	Se adapta bien a la conducción en parral con marcos amplios, aunque también se adapta a conducciones en espaldera.	
Portainjertos:	No presenta problemas de injerto, pero va mejor en menos vigorosos.	
Poda:	Poda larga a muy larga.	
Técnicas:	No es necesario efectuar técnicas de cultivo especiales, ni aplicaciones de ácido giberélico, ni poda de racimos, ni anillado, como ocurre con otras apirenas. Esporádicamente presenta problemas de mal cuajado, el cual se soluciona con cubiertas de plástico o malla, provocando además un ligero adelanto en la maduración y la fertilidad de las yemas.	
Aptitud:	Buena conservación frigorífica y resistente al transporte.	
Observaciones:	Es sensible a la sobre fertilización y a la deficiencia de Zn y Fe. Muy sensible al oidio. Además de para uva de mesa, se emplea para la elaboración de pasas, zumos, macedonias y conservas de almíbar.	