

Sisterma



Origen genético: H-123a X Frühmölle
Criador (s): JC DORST - (Países Bajos)
Registro: Catálogo francesa (1952)
Tipo: La lista A,
Categoría: Consumo
Madurez: Muy pronto para principios

caracteres descriptivos

Tubérculo: ., Ojos bastante superficiales, piel amarilla, carne Oblong corta, en lugar regularmente amarilla

Sprout: . Rojo purpúreo, esférica, cabello débil

Planta: . Bastante baja de la cintura, ancho, tipo de hoja

Tallo: pigmentación débil, con las alas ligeramente más pronunciadas, . rectilínea

Hoja: verde claro, moderadamente dividida, cerrado;folleto grande, redondeada ovalada (I = 1,70); el miembro semi-ampollas.

Floración: . No hay abundantes

Flor: cara superior blanco, púrpura cara inferior rojo, capullo de la flor parcialmente pigmentada.

Fruta: Rare.

caracteres culturales y el uso

Rendimiento: 89% de Bintje.

Clasificación: Proporción de tubérculos grandes: . Alta

sensibilidad a enfermedades:

tizón de la hoja: . Susceptibles

. Tizón del tubérculo moderadamente sensible a la verruga: no atacó.

Sarna común: . Insensibles

Virus X:

Virus R: RAS

susceptibles: Virus Y.

rollo de la hoja: . moderadamente susceptible

de nematodos RO 1-4: NTR

defectos de tubérculos internos: un poco susceptible a las manchas de óxido, muy susceptibles a corazón hueco, moderadamente susceptible a manchas de color negro.

sensibilidad a desprouting: poco sensible.

período de latencia: . Muy poca

calidad culinaria: Bueno para cocinar, culinario grupo B, ennegrecimiento después de la cocción: cero, color alevines: . mediano

contenido de materia seca: . baja

calidad de conservación: baja.

características generales

temprano, la variedad productiva, el desarrollo del tubérculo muy temprano, dando grandes tubérculos, un tanto redonda, con los ojos a veces ligeramente hundidas.